

Aproximace funkcí

Text pro studenty FP TUL
Martina Šimůnková
14. března 2015


1. Úvod. Ze dvou následujících odlišných koncepcí approximace se v tomto textu budeme věnovat jen druhé z nich.

- Aproximace funkce na intervalu** je popsána v [JV], články 7.4.4 (a odstavec nad), 7.4.5, 7.4.8, 7.4.10 a příslušný polynom nazýváme Lagrangeův.
- Aproximace funkce v okolí bodu.** Příslušný polynom nazýváme Taylorův, speciálně Maclaurinův, to pokud approximujeme v bodě 0.

2. Příklad. Na obrázku je graf funkce

$$f : x \mapsto \sqrt{x}$$

spolu s grafy jejich Taylorových polynomů v bodě 1 stupně 0 a 1 (čárkovaně), 2 (tečkovaně) a 3 (tečkovaně zeleně). Všimněte si, že approximace se zlepšuje se zvyšujícím se stupněm polynomu.



Odvodíme rovnice těchto polynomů. Definice Taylorova polynomu je v [JV] 7.4.2, pro nás bude z této definice podstatná poznámka v jejím závěru (o rovnosti derivací funkce a jejího Taylorova polynomu v bodě $x_0 = 1$, ve kterém funkci approximujeme) a příklad 7.4.1, ve kterém jsou zkonstruovány polynomy p_k :

$$p_0(x) = 1 \quad p_1(x) = x - 1 \quad p_2(x) = (x - 1)^2/2 \quad p_3(x) = (x - 1)^3/6$$

Tyto polynomy splňují:

k	$p_k(1)$	$p'_k(1)$	$p''_k(1)$	$p'''_k(1)$
0	1	0	0	0
1	0	1	0	0
2	0	0	1	0
3	0	0	0	1

Rozmyslete si, že polynom p sestavený jako lineární kombinace

$$p = \alpha p_0 + \beta p_1 + \gamma p_2 + \delta p_3$$

má hodnoty derivací

$p(1)$	$p'(1)$	$p''(1)$	$p'''(1)$
α	β	γ	δ

Zkoumaná funkce $f : x \mapsto \sqrt{x}$ má v bodě 1 funkční hodnotu a hodnoty derivací

$f(1)$	$f'(1)$	$f''(1)$	$f'''(1)$
1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$

Odtud dostaneme:

$$\begin{aligned} T_0(x) &= 1 \\ T_1(x) &= 1 + \frac{1}{2}(x - 1) \\ T_2(x) &= 1 + \frac{1}{2}(x - 1) - \frac{1}{8}(x - 1)^2 \\ T_3(x) &= 1 + \frac{1}{2}(x - 1) - \frac{1}{8}(x - 1)^2 + \frac{1}{16}(x - 1)^3 \end{aligned}$$

3. Zbytek Taylorova polynomu je definován v [JV] 7.4.6. Uvědomte si, že z vlastnosti

$$f^{(k)}(x_0) = T^{(k)}(x_0)$$

plyne

$$R^{(k)}(x_0) = 0$$

a tedy pro $k \leq n$ platí

$$R_n^{(k)}(x_0) = 0. \quad (1)$$

Odtud $(n - 1)$ -násobným použitím L'Hospitalova pravidla dostaneme (více 7.4.20)

$$\frac{R_n(x)}{(x - x_0)^n} \rightarrow 0 \quad \text{pro } x \rightarrow 0. \quad (2)$$

4. Příklad (více [JV] 7.4.14).

Maclaurinův polynom exponenciální funkce je

$$T_4(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24},$$

Maclaurinův polynom funkce sin je

$$T_4(x) = x - \frac{x^3}{6}$$

a Maclaurinův polynom funkce cos je

$$T_4(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}.$$

Můžeme tedy tyto funkce vyjádřit takto

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + R_4(x), \\ \sin(x) &= x - \frac{x^3}{6} + \tilde{R}_4(x), \\ \cos(x) &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \tilde{\tilde{R}}_4(x), \end{aligned} \quad (3)$$

kde o zbytcích R_4 , \tilde{R}_4 , $\tilde{\tilde{R}}_4$ víme, že splňují (2).

5. Složitější příklad. Chceme-li sestrojit Maclaurinův polynom stupně 6 funkce

$$f : x \mapsto \sin(3x^2),$$

můžeme bud' vypočítst derivace (uvádíme jen výsledky, podrobnosti výpočtu necháme na laskavém čtenářovi)

$$\begin{aligned} f'(x) &= 6x \cos(3x^2), \\ f''(x) &= 6 \cos(3x^2) - 36x^2 \sin(3x^2), \\ f^{(3)}(x) &= -108x \sin(3x^2) - 6^3 x^3 \cos(3x^2), \\ f^{(4)}(x) &= (6^4 x^4 - 108) \sin(3x^2) - 6^4 x^2 \cos(3x^2), \\ f^{(5)}(x) &= 6^4 10x^3 \sin(3x^2) + (6^5 x^5 - 6^3 15x) \cos(3x^2), \\ f^{(6)}(x) &= (-6^6 x^6 + 6^4 45x^2) \sin(3x^2) + (6^5 15x^4 - 6^3 15) \cos(3x^2), \end{aligned}$$

vyčíslit jejich hodnoty v nule a dostaneme

$$T_6(x) = 3x^2 - \frac{9x^6}{2}.$$

Alternativní a doporučený způsob výpočtu je dosadit $y = 3x^2$ do

$$\sin(y) = y - \frac{y^3}{6} + R_3(y).$$

Dostaneme

$$\sin(3x^2) = 3x^2 - \frac{9x^6}{2} + R_3(3x^2).$$

O zbytku R_3 víme, že splňuje (2), tedy

$$\frac{R_3(y)}{y^3} \rightarrow 0 \quad \text{pro } y \rightarrow 0,$$

odkud po substituci $y = 3x^2$ dostaneme (o substituci v limitě více v textu o limitě složené funkce)

$$\frac{R_3(3x^2)}{27x^6} \rightarrow 0 \quad \text{pro } x \rightarrow 0,$$

což je totéž jako

$$\frac{R_3(3x^2)}{x^6} \rightarrow 0 \quad \text{pro } x \rightarrow 0.$$

Vidíme, že polynom

$$T(x) = 3x^2 - \frac{9x^6}{2}$$

splňuje tvrzení věty 7.4.20 a protože víme, že jediný polynom toto tvrzení splňující je Taylorův polynom (viz znění zmíněné věty), dostali jsme hledaný výsledek

$$T_6(x) = 3x^2 - \frac{9x^6}{2}.$$

6. Výpočet limity pomocí Taylorova polynomu. Chceme vypočítst limitu $f(x)/x^6$ pro $x \rightarrow 0$, kde

$$f(x) = \sin(x^2) - x^2 e^{2x^2} + \sin(2x^4).$$

Nejdříve zvolíme stupeň polynomu – označíme jej n a dosadíme $f(x) = T_n(x) + R_n(x)$ do počítané limity

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{T_n(x) + R_n(x)}{x^6}$$

a nahlédneme, že je vhodné zvolit stupeň 6, protože pak vzhledem k (2) bude platit

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{T_6(x)}{x^6}. \quad (4)$$

Obdobně jako v předchozím příkladu odvodíme

$$\begin{aligned} \sin(x^2) &= x^2 - \frac{x^6}{6} + \tilde{R}_3(x^2), & \frac{\tilde{R}_3(x^2)}{(x^2)^3} &\rightarrow 0 \text{ pro } x \rightarrow 0, \\ x^2 e^{2x^2} &= x^2 \left(1 + 2x^2 + \frac{(2x^2)^2}{2} + \tilde{\tilde{R}}_2(2x^2) \right), & \frac{x^2 \tilde{\tilde{R}}_2(2x^2)}{x^2 (2x^2)^2} &\rightarrow 0 \text{ pro } x \rightarrow 0, \\ \sin(2x^4) &= 2x^4 - \frac{(2x^4)^3}{6} + \tilde{\tilde{\tilde{R}}}_3(2x^4), & \frac{\tilde{\tilde{\tilde{R}}}_3(2x^4)}{(2x^4)^3} x^6 &\rightarrow 0 \cdot 0 = 0 \text{ pro } x \rightarrow 0, \end{aligned}$$

Odtud dostaneme

$$\sin(x^2) - x^2 e^{2x^2} + \sin(2x^4) = x^2 - \frac{x^6}{6} - x^2 \left(1 + 2x^2 + \frac{(2x^2)^2}{2} \right) + 2x^4 + R_6(x),$$

kde jsme do zbytku R zahrnuli jak \tilde{R} , $\tilde{\tilde{R}}$ a $\tilde{\tilde{\tilde{R}}}$, tak člen obsahující x^{12} . Po úpravě dostaneme

$$\sin(x^2) - x^2 e^{2x^2} + \sin(2x^4) = -\frac{x^6}{6} - \frac{4x^6}{2} + R_6(x).$$

K výpočtu limity použijeme (4)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2) - x^2 e^{2x^2} + \sin(2x^4)}{x^6} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-13/2x^6}{x^6} = -\frac{13}{2}.$$

7. Vyčíslení výrazu. Chceme přibližně vyčíslit výraz $\sqrt{1.12}$. Použijeme Taylorův polynom spočítaný v příkladě 2.

$$\sqrt{x} = 1 + \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{8}(x-1)^2 + \frac{1}{16}(x-1)^3 + R_3(x),$$

po dosazení za x dostaneme

$$\sqrt{1.12} = 1.058308 + R_3(1.12).$$

K odhadu zbytku (chyby výpočtu) použijeme tvar zbytku [JV] (7.12). Dostaneme

$$R_3(1.12) = \frac{f^{(4)}(\zeta)}{24} 0.12^4, \quad \text{kde } f(x) = \sqrt{x}, \quad \zeta \in (1, 1.12).$$

Výpočet dá $R_3(1.12) = -8.1 \times 10^{-6}(\zeta)^{-7/2}$, kde $\zeta \in (1, 1.12)$. Odtud vidíme, že pouze poslední cifra v $\sqrt{1.12} \doteq 1.058308$ je nepřesná a dostali jsme výpočet odmocniny zaokrouhlený na 5 desetinných míst.

$$\sqrt{1.12} \doteq 1.05830.$$